

Problemes Geometria 7

1.- En una successió de cercles de radi decreixent, cadascun d'ells és tangent exterior a la següent i als costats d'un angle recte. Determineu la raó entre l'àrea del primer cercle i la suma de les àrees dels infinits cercles.

Oposicions Catalunya 1998.

2.- Donada una circumferència de radi $R > 0$ fixa, un punt O fix i una recta tangent a la circumferència en un punt diametralment oposat a O , es traça per O una recta secant variable que talla en B a la circumferència i en C a la recta tangent. Sobre la recta secant es considera el punt A tal que $\overline{OA} = \overline{BC}$. Determineu l'equació del lloc geomètric dels punts A .

Oposicions València 2001.

3.- Construïu raonadament un triangle rectangle d'hipotenusa donada a tal que la mitjana sobre la hipotenusa siga la mitjana geomètrica dels dos catets del triangle.

Oposicions Catalunya 1997.

4.- Siga el triangle $\triangle ABC$ de costats a, b, c tal que $a + b + c = 60$, $\frac{b+c}{4} = \frac{a+c}{5} = \frac{a+b}{6}$.

a) Proveu que els costats a, b, c del triangle estan en progressió aritmètica.

b) Calculeu $\sin A : \sin B : \sin C$.

5.- Siga el triangle $\triangle ABC$, proveu que si $\cos A \cdot \sin \frac{A}{2} = \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$ el triangle és isòsceles.

6.- Donada la circumferència de centre O i radi r i un punt exterior P , determineu la distància \overline{OP} en funció de r a fi que l'àrea generada pel segment de la tangent \overline{AP} (A és el punt de tangència) al girar al voltant de \overline{OP} siga el triple de l'àrea generada per l'arc AB al girar al voltant de \overline{OP} essent B el punt de tall de la circumferència amb \overline{OP} .

Oposicions d'Astúries 2004.

7.- Donada la circumferència $x^2 + y^2 - 6x = 0$ i la recta $r \equiv y - 3 = 0$ es traça per l'origen de coordenades O una recta s que talla la circumferència en un punt A distint de O i a la recta r en el punt B . La paral·lela per A a l'eix OX i la paral·lela per B a l'eix OY es tallen en un punt P . Es demana:

a) Determineu el lloc geomètric del punt P quan la recta s varia passant per O

b) Estudiar el lloc geomètric i representeu-lo determinant els seus elements més notables.

Oposicions Cantàbria 2004.

8.- Un segment \overline{AB} de longitud 4 es mou tenint el seu extrem A sobre la recta $r_1 \equiv y - 3x + 1 = 0$ i el seu extrem B sobre la recta $r_2 \equiv 3y + x - 7 = 0$. Determineu el lloc geomètric del punt mig del segment \overline{AB} .

Oposicions Andalusia 2004.

9.- Donat el rectangle ABCD amb $a = \overline{AB}$ (base) i $b = \overline{BC}$ altura i $a > b$ des de la base \overline{AB} es construeix internament el triangle equilàter $\triangle ABX$ i des de l'altura \overline{BC} es

construeix exteriorment un triangle equilàter $\triangle BCY$. Les rectes AX i BY es tallen en el punt Z. Es demana:

- Determina la relació entre la base i l'altura del rectangle a fi que els punts X, C Y estiguen alineats.
- Caracteritza i calcula en aquest cas tots els elements significatius: costats, angles, mitjanes, bisectrius interiors i exteriors, radi inscrit i radi circumscrit del triangle $\triangle XYZ$.

10.- Es considera una el·lipse i siga A un dels seus punts. Per cada punt X de l'el·lipse siga X' el punt mig del segment \overline{AX} . Determineu el lloc geomètric descrit pel punt X' quan X recorre l'el·lipse.

Determineu el lloc geomètric en el cas de l'el·lipse $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$ i A(4,6).

Oposicions Madrid 2002.